

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : C07K 14/685, A61K 47/48	A2	(11) Numéro de publication internationale: WO 96/41815 (43) Date de publication internationale: 27 décembre 1996 (27.12.96)
--	----	--

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR96/00890

(22) Date de dépôt international: 12 juin 1996 (12.06.96)

(30) Données relatives à la priorité:
95/06909 12 juin 1995 (12.06.95) FR(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): INSTITUT
EUROPEEN DE BIOLOGIE CELLULAIRE [FR/FR]; 18,
avenue de l'Europe, F-31520 Ramonville-Saint-Agne (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): DUSSOURD
D'HINTERLAND, Lucien [FR/FR]; 10, rue Pierre-Benoit,
F-31400 Toulouse (FR). PINEL, Anne-Marie [FR/FR];
771, rue des Navigateurs, La Grande-Motte, F-34280 La
Grande-Motte (FR).(74) Mandataires: MARTIN, Jean-Jacques etc.; Cabinet Regim-
beau, 26, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).(81) Etats désignés: AU, CA, IL, JP, NZ, US, brevet européen (AT,
BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE).

Publiée

*Sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès
réception de ce rapport.*(54) Title: CONJUGATES OF α MSH WITH A FATTY ACID, PREPARATION METHOD THEREFOR, AND USE THEREOF AS A
DRUG(54) Titre: CONJUGUES D' α MSH AVEC UN ACIDE GRAS, LEUR PROCÉDE DE PREPARATION ET LEUR UTILISATION A
TITRE DE MÉDICAMENT

(57) Abstract

A peptide conjugate comprising a peptide sequence that includes at least one sequence of four α MSH-derived amino acids optionally in a natural form, said sequence being chemically or physically conjugated with acids selected from either dicarboxylic acids of general formula (I): HOOC-R1-COOH , wherein R1 is a straight or branched alkylene radical having at least 3 and preferably 3-10 carbon atoms, and being optionally substituted, in particular by one or more amino or hydroxy groups; or α -monounsaturated fatty acids with a cis or preferably trans configuration, of general formula (II): R2-CH=CH-COOH , wherein R2 is a straight or branched alkyl radical having at least 6 and preferably 6-10 carbon atoms, and being substituted by an amino, hydroxy or oxo group.

(57) Abrégé

L'invention concerne un conjugué peptidique, caractérisé en ce qu'il comporte une séquence peptidique comprenant au moins une séquence de 4 acides aminés dérivés de l' α MSH, les acides aminés étant sous forme naturelle ou non, ladite séquence étant conjuguée, chimiquement ou physiquement avec des acides sélectionnés parmi: les acides di-carboxyliques de formule générale (I): HOOC-R1-COOH , dans laquelle R1 représente un radical alkylène, linéaire ou ramifié, comprenant au moins 3 atomes de carbone, de préférence de 3 à 10 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupes amino ou hydroxy, et les acides gras α -monoinsaturés de configuration cis ou trans, de préférence trans, de formule générale (II): R2-CH=CH-COOH , dans laquelle R2 représente un radical alkyle, linéaire ou ramifié comprenant au moins 6 atomes de carbone, de préférence de 6 à 10 atomes de carbone, substitué par un groupe amino, hydroxy ou oxo.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Arménie	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
AT	Autriche	GE	Géorgie	MX	Mexique
AU	Australie	GN	Guinée	NE	Niger
BB	Barbade	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BE	Belgique	HU	Hongrie	NO	Norvège
BF	Burkina Faso	IE	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BG	Bulgarie	IT	Italie	PL	Pologne
BJ	Bénin	JP	Japon	PT	Portugal
BR	Brésil	KE	Kenya	RO	Roumanie
BY	Bélarus	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CA	Canada	KP	République populaire démocratique de Corée	SD	Soudan
CF	République centrafricaine	KR	République de Corée	SE	Suède
CG	Congo	KZ	Kazakhstan	SG	Singapour
CH	Suisse	LI	Liechtenstein	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LR	Libéria	SN	Sénégal
CN	Chine	LT	Lituanie	SZ	Swaziland
CS	Tchécoslovaquie	LU	Luxembourg	TD	Tchad
CZ	République tchèque	LV	Lettonie	TG	Togo
DE	Allemagne	MC	Monaco	TJ	Tadjikistan
DK	Danemark	MD	République de Moldova	TT	Trinité-et-Tobago
EE	Estonie	MG	Madagascar	UA	Ukraine
ES	Espagne	ML	Mali	UG	Ouganda
FI	Finlande	MN	Mongolie	US	Etats-Unis d'Amérique
FR	France	MR	Mauritanie	UZ	Ouzbékistan
GA	Gabon			VN	Viet Nam

*CONJUGUES D' α MSH AVEC UN ACIDE GRAS, LEUR PROCÉDE DE PRÉPARATION ET
LEUR UTILISATION A TITRE DE MÉDICAMENT*

La présente invention a pour objet la réalisation de dérivés peptidiques homologues de l' α MSH ou Mélanotropine, obtenus par synthèse chimique, présentés sous forme de lipo-peptides.


L' α MSH et ses homologues ont fait l'objet de nombreuses publications, voire même d'essais thérapeutiques sans que cela se traduise par la réalisation d'un médicament. La raison principale est l'extrême ubiquité de l' α MSH en fonction des doses administrées et des voies d'administration.

De plus, l'absence de relation doses / effets (ce qui est le cas de nombreuses hormones peptidiques) complique sérieusement son utilisation thérapeutique. En effet, les récepteurs cellulaires de l' α MSH et de ses homologues sont du type G et la transduction intra-cellulaire s'effectue selon le cycle de l'AMP cyclique, l'activation de ces récepteurs cellulaires est sensiblement inversement proportionnelle aux doses d'hormones peptidiques, acceptées par les structures du récepteur membranaire.

La présente invention repose sur la recherche de structures peptidiques spécifiquement orientées vers les activités anti-allergiques et anti-inflammatoires d'une part, et activatrices de la mélanogénèse d'autre part à l'exclusion de tout autre effet pharmacologique notamment au niveau du système nerveux central, comme du système nerveux périphérique.


Plus particulièrement, la présente invention concerne un conjugué comportant une séquence peptidique comprenant au moins une séquence de 4 acides aminés dérivés de l' α MSH, les acides aminés étant sous forme naturelle ou non, ladite séquence étant conjuguée, chimiquement ou physiquement avec des acides notamment dérivés d'acides à activités métaboliques connues, sélectionnés parmi :

- les acides dicarboxyliques de formule générale I



dans laquelle R1 représente un radical alkylène, linéaire ou ramifié, comprenant au moins 3 atomes de carbone de préférence ayant de 3 à 10 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupes amino ou hydroxy, et

- les acides gras α -monoinsaturés de formule générale II



dans laquelle R2 représente un radical alkyle, linéaire ou ramifié comprenant au moins 6 atomes de carbone, de préférence de 6 à 10 atomes de carbone éventuellement substitué par un groupe amino, hydroxy ou oxo, ces acides ayant la configuration cis ou trans, de préférence trans.

5 La séquence de l' α MSH est la suivante :

N-acétyl-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phé-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH₂

Dans ce qui suit, lorsque l'on mentionne les séquences provenant de l' α MSH il faut entendre que les acides aminés peuvent être sous forme D, L, ou D,L ou bien sous les formes non naturelles des acides aminés correspondant à des dérivés, notamment substitués, halogénés par exemple.

10 Les peptides conjugués de bas poids moléculaire selon l'invention sont avantageusement liés sous forme de sels, d'esters ou d'amides, à des acides possédant des fonctions métaboliques essentielles dans l'activation du cycle tricarboxylique cellulaire tels qu'ils sont décrits précédemment.

15 Les acides de formules générales I ou II sont de préférence choisis parmi les diacides carboxyliques pour lesquels R1 représente un reste alkylène en C₄-C₈, substitué ou non, en particulier les acides adipiques, α -amino-adipiques et dérivés, l'acide sébacique et dérivés, les acides gras α -monoinsaturés pour lesquels R2 représente un reste alkyle, linéaire ou ramifié en C₇, en particulier les acides hydroxydécénoïques, et décénoïques, sous forme des sels, esters, ou amides correspondants.

20 Il s'agit de préférence de l'acide adipique ou "acide hexanedioïque" (ADIP), de l'acide α -amino adipique (2-amino hexanedioïque), de l'acide sébacique ou acide décanedioïque, de l'acide trans - 10 - hydroxy - Δ^2 - décénoïque ou acide trans-hydroxy - 10 - décène - 2 - oïque (AH), et de l'acide trans-oxo - 9 - décène - 2 - oïque (9 - ADO).

25 Parmi ces acides, figurent préférentiellement pour des applications en phase soluble dans l'eau, les acides adipiques et amino-adipiques.

30 Parmi les acides figurent les acides gras suivants plus particulièrement adaptés pour l'obtention de dérivés peptidiques liposolubles, l'acide sébacique et ses dérivés, l'acide oxo-décéné-oïque, et l'acide trans-hydroxy-décénoïque, définis précédemment, et dont les activités biologiques sont liées à leurs propriétés, anti-androgène, anti-séborrhéique et lipolytiques (Madéa et coll., Nippon, Hifuka - 98 (4) p. 469 - 1988).

Plus spécifiquement, la présente invention concerne des peptides activateurs de la mélanogénèse, anti-allergique et anti-inflammatoire.

La séquence de 4 acides aminés provenant de l' α MSH, des conjugués selon l'invention, comprend de préférence au moins l'une des séquences peptidiques suivantes :

- Glu - His - Phé -

- His - Phé - Arg -

- Glu - His - Phé - Arg -

dans laquelle Phé représente la phénylalanine ou un dérivé halogéné de la phénylalanine, notamment D-homo-Phé et parafluoro-Phé les acides aminés pouvant être sous forme D, L, ou D,L.

D'une manière avantageuse, les conjugués selon l'invention répondent à la formule générale III :

A - X - Glu - His - Phé - Y (III)

dans laquelle

A est un acide de formules générales I ou II telles que définies ci-dessus, en particulier l'acide adipique, ou l'acide α -amino adipique, l'acide sébacique, l'acide trans-oxo-9-décène-2-oïque ou l'acide trans-hydroxy-10-décène-2-oïque,

X représente un groupe 5-Me.Norleucine (Me.Nle), 2-N-Me-Norceuline (N-Me.Nle), OH ou NH₂,

Y représente un reste Arg - Z ou Z dans lequel Z est Trp - Gly - OH, Trp - OH, OH, Trp - Gly - NH₂, Trp - NH₂, ou NH₂,

Phé représente un reste D-Homo-Phé ou para-fluoro-Phé, les acides aminés étant sous forme D, L ou D,L.

La présente invention concerne particulièrement les dérivés peptidiques suivants :

1 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - Gly - NH₂

2 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - NH₂

30 3 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - NH₂

4 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - NH₂

5 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - Gly - NH₂

6 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - NH₂

7 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - NH₂

- 8 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - NH₂
 9 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - Gly - NH₂
 10 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - NH₂
 11 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - NH₂
 12 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - NH₂
 5 13 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - Gly - OH
 14 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - OH
 15 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - OH
 16 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - Gly - OH
 17 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - OH
 10 18 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - Gly - OH
 19 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - OH
 20 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - OH
 21 A - N - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - Gly - OH
 22 A - N - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - OH
 15 A étant défini ci-dessus, ainsi que les dérivés de ces molécules sous forme de sels d'esters ou d'amides.

Dans les conjugués 1 à 22 ci-dessus, la position de l'acide A correspond au dérivé ester ou amide, la fraction acide carboxylique de l'acide assurant la liaison.

- 20 Les séquences d'acides-amino mentionnées précédemment peuvent être des séquences d'acides-amino naturels ou des séquences d'acides-amino non naturels. De même dans certains cas il est possible que certains de ces acides-amino comportent des fonctions par exemple des glycosylations. Il doit être entendu que la présente invention concerne également l'ensemble de
 25 ces formes comprises par la présente description.

La présente invention concerne également des médicaments contenant un ou plusieurs des conjugués selon l'invention.

La présente invention concerne également l'utilisation de ces composés dans le domaine de la cosmétique.

- 30 La présente invention concerne également des compositions galéniques, pharmaceutiques, dermo-cosmétiques ou cosmétiques comprenant un composé tel que défini précédemment.

Ces compositions peuvent se présenter sous l'une des formes connues dans les domaines cosmétiques bien que les formes topique et
 35 parentérale soient préférées.

Ces compositions sont utilisables aussi bien dans le domaine humain que vétérinaire.

Un des objets de la présente invention est l'application par voie topique et parentérale des conjugués peptidiques précédents. Les compositions pharmaceutiques peuvent être sous forme administrable par voie orale ou parentérale, injectable notamment, mais de préférence sous forme administrable par voie topique externe.

Ces compositions peuvent être notamment, sous forme de crème, spray, ou lotion par exemple et comporter des excipients connus et éventuellement d'autres principes actifs. Avantageusement, il s'agit de préparations dermo-cosmétologiques sous forme de solutions, de lotions d'émulsions, ou de crèmes utilisées comme accélérateur de bronzage de la peau, sans exposition aux U.V.

Les composés selon la présente invention sont utiles notamment dans la prévention et le traitement des allergies notamment cutanées, des réactions inflammatoires, et des troubles de mélanogénèse.

Les conjugués dont la séquence peptidique possède en position 4 l'acide-amino para-fluoro-Phé (dérivés peptidiques 5 à 8 et 18 à 22), sont particulièrement orientés vers une activité biologique anti-allergique et anti-inflammatoire, par effet suppresseur sur les médiateurs de l'inflammation et de l'allergie (IL1, IL6, α TNF, PGE₂), à l'exclusion d'une action sur la mélanogénèse.

Les conjugués dont les séquences en position 4 possèdent l'acide-amino D-homo-Phé (dérivés peptidiques 1 à 4 et 9 à 17), sont particulièrement orientés vers des activités de stimulation des processus de mélanogénèse, et possèdent également une activité anti-allergique et anti-inflammatoire.

Les séquences peptidiques selon la présente invention peuvent être obtenues par l'un des procédés quelconque connus de l'homme de métier, notamment par des procédés de synthèse chimique dans laquelle on peut intégrer les différents acides. En tout état de cause compte tenu de la faible dimension des peptides, la synthèse chimique est tout à fait possible et permet d'obtenir des produits très purs.

D'autres caractéristiques des conjugués selon l'invention apparaîtront à la lumière des exemples ci-après, qui illustrent également leur procédé de préparation par synthèse chimique.

Exemple 1 : Synthèse du conjugué 1 - A = Acide Adipique

Adipoyl - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - Gly - NH₂.

La synthèse a été réalisée par la méthode de Merrifield en phase solide en utilisant une résine MBHA, et comme groupement protecteur FMOC (fluoroényl méthoxy carbonyl).

Les dérivés d'acides aminés utilisés sont les suivants :

FMOC - Gly - OH,

FMOC - Trp - OH,

FMOC - Arg (Tos) - OH,

FMOC - D-homo-Phé - OH,

FMOC - His (Trt) - OH,

FMOC - Glu (chex) - OH, et

FMOC - Me.Nle - OH,

que l'on couple en utilisant le BOP comme agent de couplage.

Chaque acide aminé est utilisé en excès (x2) ainsi que le BOP (x2) et chaque couplage est répété 2 fois.

L'acide adipique est couplé de façon similaire, le groupement FMOC étant éliminé à chaque étape par la pipéridine (20 % dans le diméthylformamide). La déprotection finale est effectuée en deux étapes :

a) acide trifluoroacétique (2 fois x 5 minutes)

b) acide fluorhydrique anhydre / p-crésol 95,5 (45 minutes).

Le composé brut obtenu avec un rendement de 78 % est repris dans un mélange eau/acide acétique 95,5 % et est ensuite lyophilisé.

Le composé P1 obtenu a une pureté de 82 % (HPLC). 100 mg de ce composé sont ensuite purifiés par HPLC en utilisant une colonne C18 et on obtient 65 mg de produit pur.

Temps de rétention = 17,04 minutes dans les conditions suivantes :

- colonne C8 (250 mm x 5 mm), détection UV 210 nm

- solvant tampon phosphate Triéthylamine - acétonitrile 10 - 60 % en 15 minutes ; débit 1,4 ml /minute.

Analyse des acides aminés

Glu 1,02 - Gly 1,01 - His 1,00 - Arg 0,94 - D-homo-Phé 1,03 - (le Tryptophane n'a pas été déterminé car il se dégrade lors de l'hydrolyse acide).

Spectre de masse (FAB +) 1018,4 / 1126,5

Exemple 2 : Synthèse du conjugué 5 - A = Acide Adipique

En reprenant le mode opératoire de l'exemple 1 et en remplaçant Fmoc-D-homo-Ph-OH par Fmoc-para-fluoro-Phé-OH, on obtient le composé P2 :

5 Adipoyl - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - Gly - NH₂.

F = 120°C, décomposition. (α)_D - 7 (c = 0,4 DMF). HPLC : colonne C₁₈, 5 μ m, débit 7 mL/min, détection 279 nm, solvant d'élution TFA 0,1 % / acétonitrile 77/23 v/v, temps de rétention 30,45 min. ¹H RMN (DMSO-d₆) ppm : Me.Nle (4,76, 1,62, 1,24, 0,82) ; Glu (8,54, 4,32, 1,86-1,72, 2,24) ; His (8,09, 4,53, 2,95-2,82) ; Para-Fluoro-Phé (8,09, 4,53, 3,00-2,78, 7,3-7,0) ; Arg (8,36, 4,29, 1,54-1,68, 1,45, 3,07) ; Trp (8,07, 4,53, 3,16-3,01, 10,80, 7,19, 7,56, 7,30, 6,96) ; Gly (8,18, 3,67-3,54).

Exemple 3 : Synthèse du conjugué 1 - A - Acide trans-10-hydroxy-2-décénoïque

En opérant comme dans l'exemple 1, en remplaçant l'acide adipique par l'acide trans-10-hydroxy-2-décénoïque, on obtient le composé P3 :

trans-10-hydroxy-2-décénoyle - Me.Nle - Glu - His - D-Homo-Phé - Arg - Trp - Gly - NH₂.

20 F = 115°C, décomposition. (α)_D - 16 (c = 0,3 DMF). HPLC : colonne C₁₈, 5 μ m, débit 7 mL/min, détection 279 nm, solvant d'élution TFA 0,1 % / acétonitrile 71/29 v/v, temps de rétention 24,20 min. ¹H RMN (DMSO-d₈) ppm : Ac (1,84) ; Me.Nle (8,00, 4,15, 1,59-1,48, 1,23, 0,83) ; Glu (8,00, 4,15, 1,86-1,72, 2,19) ; His (8,00, 4,54, 3,00-2,88, 8,89, 7,26) ; D-Homo-Phé (7,98, 4,53, 2,99-2,78, 7,3-7,0) ; Arg (8,27, 4,29, 1,67-1,53, 1,46, 3,08) ; Trp (8,07, 4,54, 3,16-3,01, 10,80, 7,16, 7,56, 7,30, 7,04, 6,96) ; Gly (8,19, 3,68-3,54).

Exemple 4 : Synthèse du conjugué 2 - A = Acide α -Amino-Adipique

30 En opérant comme dans l'exemple 1, en remplaçant l'acide adipique par l'acide α -amino-adipique, on obtient le composé P4 :

α -amino-adipoyl - Me.Nle - Glu - His - D-Homo-Phé - Arg - Trp - NH₂.

F = 130°C, décomposition. (α)_D - 5 (c = 0,5 DMF). HPLC : colonne C₁₈, 5 μ m, débit 7 mL/min, détection 279 nm, solvant d'élution TFA 0,1 % /

acétonitrile 77/23 v/v, temps de rétention 28,80 min. ^1H RMN (DMSO-d_6) ppm : Me.Nle (3,77, 1,62, 1,24, 0,82) ; Glu (8,53, 4,32, 1,82-1,71, 2,25) ; His (8,11, 4,53, 2,98-2,83) ; D-Homo-Phé (8,06, 4,47, 2,99-2,77, 7,25-7,1) ; Arg (8,32, 4,30, 1,69-1,55, 1,45, 3,07) ; Trp (8,02, 4,59, 3,16-3,00, 10,78, 7,15, 7,58, 7,30, 7,04, 6,96).

5

Exemple 5 : Synthèse du conjugué 3 - A = Acide Sébacique

En reprenant le mode opératoire de l'exemple 1, sans les réactifs Fmoc - Gly - OH et Fmoc - Trp - OH, en remplaçant l'acide adipique par l'acide sébacique, on obtient le composé P5 :

10 Sébaçoyle - Me.Nle - Glu - His - D-Homo-Phé - Arg - NH_2 .

F = 130°C , décomposition. $(\alpha)_D - 3,2$ (c = 0,5 DMF). HPLC : colonne C_{18} , 5 μm , débit 7 mL/min, détection 279 nm, solvant d'élution TFA 0,1 % / acétonitrile 77/23 v/v, temps de rétention 21,86 min. ^1H RMN (DMSO-d_6) ppm : Me.Nle (4,70, 1,80, 2,30, 1,95) ; Glu (8,57, 4,30, 1,82-1,71, 2,25) ; His (8,21, 4,55, 2,98-2,83) ; Phé (8,09, 4,55, 2,99-2,77, 7,25-7,1) ; Arg (8,31, 4,30, 1,69-1,55, 1,45, 3,07) ; Trp (7,95, 4,61, 3,16-3,00, 10,78, 7,15, 7,58, 7,30, 7,04, 6,96) ; Gly (8,32, 3,75).

15

Exemple 6 : Etude de l'activité Anti-allergique des conjugués peptidiques, par le test d'Hypersensibilité de contact au Dinitro-fluorobenzène (DNFB).

20

Matériel et méthode

25 Des souris femelles C57 BL/6JICO, âgées de 5 semaines sont réparties en dix lots de dix animaux (cinq par cage), avec libre accès à l'eau et à la nourriture, soumises à une photopériode de douze heures de lumière par vingt-quatre heures.

Les animaux des lots 1 à 6 reçoivent quotidiennement et par application topique sur la peau rasée du dos, les produits à étudier (conjugués 1 et 5 représentés par les composés P1 et P2 préparés selon les exemples 1 et 2), mis en solution dans du propylène glycol, sous un volume constant de 50 μl et cela pendant cinq jours consécutifs.

30

Posologie par souris et par jour

35 Composé P1 - Lots 1, 2 et 3 - 2,5 μg , 0,5 μg et 0,1 μg /souris/jour respectivement.

Composé P2 - Lots 4, 5 et 6 - 2,5 µg, 0,5 µg et 0,1 µg /souris/jour respectivement.

Les animaux du lot 10 servent de témoins (ils reçoivent seulement, 50 µl de propylène glycol par application topique pendant cinq jours).

Au cinquième jour, trente minutes après la dernière application toutes les souris sont sensibilisées avec 25 µl de D N F B (2,4-dinitro-1-fluorobenzène (FLUKA CHEMIKA PURUM à 97 % lot n° 33820890)) à 2 % dans un mélange 4 pour 1 d'acétone (SDS réf 0510) et de trioléine (FLUKA) appliqué par voie topique sur la région dorsale de peau rasée.

Au sixième jour, on procède à une nouvelle sensibilisation par application de D N F B.

Au onzième jour, l'épaisseur des oreilles des souris, est mesurée à l'aide d'un micromètre (ROCH 0 à 25 mm au 1/100 mm) afin d'obtenir des valeurs de base, puis les oreilles sont stimulées par application topique de 20 µl de D N F B à 0,8 %.

Au douzième jour, l'épaisseur des oreilles est à nouveau mesurée. On établit la valeur moyenne de l'épaississement des oreilles pour les souris des lots qui ont reçu les produits à étudier, ainsi que pour les souris du lot témoin.

Le pourcentage de suppression éventuelle sera exprimé par le calcul suivant :

$$\frac{T - E}{T} \times 100$$

avec T pour le pourcentage d'augmentation de l'épaisseur moyenne des oreilles du lot témoin et E pour celui des lots qui ont reçu les produits à étudier.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 1 ci-après.

TABLEAU 2
Action du Conjugué 1

Concentration IL1 (ng)	Concentration Conjugué 1 (M)	PGE2 pg/mg d'ADN	% inhib.
2,5	0	389 ± 60	-
	10 ⁻⁴	179 ± 50	53
	10 ⁻⁵	232 ± 45	40
	10 ⁻⁶	292 ± 68	24
	10 ⁻⁷	364 ± 68	6
	10 ⁻⁸	335 ± 50	13
	10 ⁻⁹	320 ± 43	17
0,5	0	288 ± 25	-
	10 ⁻⁴	113 ± 25	60
	10 ⁻⁵	176 ± 37	38
	10 ⁻⁶	231 ± 55	19
	10 ⁻⁷	249 ± 60	13
	10 ⁻⁸	258 ± 35	10
	10 ⁻⁹	364 ± 56	-

Les résultats montrent une bonne action inhibitrice du conjugué 1 avec un rapport effet dose. Cette action ne dépend pas de la concentration en IL1. On n'observe pas d'action à partir de 10⁻⁷ M dans les deux cas.

WO 96/41815

PCT/EP06/00900

Le pourcentage de stimulation est calculé en fonction des valeurs QE et QT, avec QE pour la quantité moyenne de mélanine par mg de peau de l'échantillon testé et QT pour la quantité moyenne de mélanine par mg de peau du témoin, selon la formule

5

$$\% \text{ de stimulation} = \frac{QE - QT}{QT} \times 100$$

La crème dermique 1 administrée par voie topique, induit de façon hautement significative la synthèse de la Mélanine au niveau de l'épiderme (+ 75 %). Cette activité conforme à l'objet de la présente invention est liée à la structure chimique du conjugué 1 qui contient le groupement D-homo-Phé.

Par contre, la crème dermique 5 administrée par voie topique, n'a pas d'activité sur la stimulation de la mélanogénèse épidermique, cette absence d'activité est liée à la présence dans le conjugué 5 du groupement para-fluoro-Phé.

Ces résultats ont été confirmés par une étude sur la mélanogénèse selon la technique dite de "CLOUDMAN" par culture de mélanocytes in vitro, en utilisant les cellules du mélanome de CLOUDMAN chez le rat.

L'ensemble des résultats obtenus sont conformes à l'objet de la présente invention dont l'objectif est la réalisation de conjugués actifs par voie topique et dont les activités anti allergiques et anti inflammatoires peuvent être séparées de l'activité sur la mélanogénèse selon les applications envisagées.

25 Exemple 9 : Etude comparative de l'activité des conjugués et de leurs structures peptidiques, sur l'hypersensibilité de contact au D N F B.

Matériel et méthode

30 La méthode utilisée est celle décrite précédemment dans l'exemple N° 4, hypersensibilité de contact induite chez la souris par la D N F B.

- Produits étudiés

Lot I : trans-10-hydroxy-2-décénoyl - Me-Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - Gly - NH₂

35 - Conjugué 1 représenté par le composé P3.

Lot II : Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - Gly - NH₂

Lot T : Témoin = Acide trans-10-hydroxy-2-décénoïque.

Solvant : le propylène glycol

TABLEAU 5

	Lot	Dose*	%	%	%	%
			Augment. O. Gauche	Augment. O. Droite	Suppress. O. Gauche	Suppress. O. Droite
5	I	2,5	11,00	11,40	80,28	79,64
	I	0,5	13,00	12,90	76,70	76,96
	I	0,1	15,60	14,60	72,04	73,92
	T	0,01	55,80	56,00	-	-
10	II	2,5	17,60	18,50	69,17	67,82
	II	0,5	24,00	22,80	57,96	60,34
	II	0,1	32,00	30,20	43,95	47,47
	T	0,01	57,10	57,50	-	-

* µg/souris/jour.

15 On observe 80 % de suppression de l'hypersensibilité cutanée à la dose de 2,5 µg/souris/jour pour le conjugué 1 (composé P3) selon l'invention, et une nette relation doses/effets entre les doses de 0,1, 0,5 et 2,5 µg/souris/jour. Par contre, pour le peptide seul, on observe 47 % de suppression de l'hypersensibilité cutanée à la dose de 0,1 µg/souris/jour et, pour les doses de 0,5 µg et de 2,5 µg, la réponse suppressive est de l'ordre de 60 et 69 %.


20 Enfin, on n'observe pas d'effet suppressif de l'hypersensibilité cutanée par administration de l'acide trans-10-hydroxy-2-décénoïque, en solution dans le propylène - glycol.

25 Administrés par voie topique et dans les conditions expérimentales décrites, le conjugué 1 selon l'invention induit de façon hautement significative la suppression de l'hypersensibilité cutanée chez la souris.

REVENDICATIONS


1 - Conjugué peptidique, caractérisé en ce qu'il comporte une séquence peptidique comprenant au moins une séquence de 4 acides aminés dérivés de l' α MSH, les acides aminés étant sous forme naturelle ou non, ladite séquence étant conjuguée, chimiquement ou physiquement avec des acides sélectionnés parmi :

- les acides di-carboxyliques de formule générale I



dans laquelle R1 représente un radical alkylène, linéaire ou ramifié, comprenant au moins 3 atomes de carbone, de préférence de 3 à 10 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupes amino ou hydroxy, et

- les acides gras α -monoinsaturés de configuration cis ou trans, de préférence trans, de formule générale II



dans laquelle R2 représente un radical alkyle, linéaire ou ramifié comprenant au moins 6 atomes de carbone, de préférence de 6 à 10 atomes de carbone, substitué par un groupe amino, hydroxy ou oxo.

2 - Conjugué selon la revendication 1, caractérisé en ce que la séquence d'acides aminés est liée à l'acide sélectionné sous forme de sel, d'ester ou d'amide.

3 - Conjugué selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que les acides de formules générales I ou II sont de préférence choisis parmi les diacides carboxyliques de formule I pour lesquels R1 représente un reste alkylène en $\text{C}_4\text{-C}_8$, substitué ou non, en particulier les acides α -adipiques, α -amino-adipiques et dérivés, l'acide sébacique et dérivés, les acides gras α -monoinsaturés de formule II pour lesquels R2 représente un reste alkyle, linéaire ou ramifié en C_7 , en particulier les acides hydroxydécénoïques, et décénoïques, sous forme des sels, esters, ou amides correspondants.

4 - Conjugué selon la revendication 3, caractérisé en ce que les acides de formules générales I ou II sont de préférence choisis parmi l'acide adipique, l'acide α -amino adipique, l'acide sébacique, l'acide trans - 10 - hydroxy - Δ^2 - décénoïque et l'acide trans-oxo - 9 - décène - 2 - oïque.

5

- Glu - His - Phé -
- His - Phé - Arg -
- Glu - His - Phé - Arg -

dans laquelle Phé représente la phénylalanine ou un dérivé halogéné de la phénylalanine notamment D-homo-Phé et parafluoro-Phé, les acides aminés pouvant être sous forme D, L ou D,L

10

6 - Conjugué selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il s'agit de conjugués de formule générale III :

A - X - Glu - His - Phé - Y (III)

dans laquelle

15

A est un acide de formules générales I ou II telles que définies dans les revendications 1, 3 et 4,

X représente un groupe 5-Me.Norleucine (Me.Nle), 2-N-Me.Norceuline (N-Me.Nle), OH ou NH₂.

Y représente un reste Arg - Z ou Z dans lequel Z est Trp - Gly - OH, Trp - OH, OH, Trp - Gly - NH₂, Trp - NH₂, ou NH₂.

20

Phé représente un reste D-Homo-Phé ou para-fluoro-Phé, les acides aminés étant sous forme D, L ou D,L.

7 - Conjugué selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il est sélectionné parmi les dérivés peptidiques suivants :

25

1 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - Gly - NH₂

2 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - NH₂

3 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - NH₂

4 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - NH₂

5 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - Gly - NH₂

6 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - NH₂

30

7 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - NH₂

8 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - NH₂

9 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - Gly - NH₂

10 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé- Arg - Trp - NH₂

11 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - NH₂

35

12 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - NH₂

13 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - Gly - OH

14 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - OH

- 15 A - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - OH
16 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - Gly - OH
17 A - N - Me.Nle - Glu - His - D-homo-Phé - Arg - Trp - OH
18 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - Gly - OH
5 19 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - OH
20 A - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - OH
21 A - N - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - Gly - OH
22 A - N - Me.Nle - Glu - His - para-fluoro-Phé - Arg - Trp - OH

10 A étant un acide de formules générales I ou II telles que définies dans les revendications 1, 3 et 4, ainsi que les dérivés de ces molécules sous forme de sels d'esters ou d'amides.

8 - A titre de médicaments, les conjugués selon l'une des revendications 1 à 7.

15 9 - Médicament selon la revendication 8, utile pour le traitement des allergies notamment cutanées, des réactions inflammatoires et des troubles de la mélanogénèse, utilisable en médecine humaine et vétérinaire.

10 - Composition galénique, caractérisée en ce qu'elle comprend un conjugué selon l'une des revendications 1 à 7.

20 11 - Composition galénique selon la revendications 10, caractérisée en ce qu'il s'agit de préparations dermo-cosmétologiques sous forme de solutions, de lotions d'émulsions, ou de crèmes utilisées comme accélérateur de bronzage de la peau, sans exposition aux U.V.

25 12 - Composition galénique selon l'une des revendications 10 ou 11, caractérisée en ce qu'il s'agit de préparations galéniques, sous forme de solutions, de lotions, de crème, de spray.



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : C07K 14/685, A61K 47/48	A3	(11) Numéro de publication internationale: WO 96/41815 (43) Date de publication internationale: 27 décembre 1996 (27.12.96)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR96/00890 (22) Date de dépôt international: 12 juin 1996 (12.06.96) (30) Données relatives à la priorité: 95/06909 12 juin 1995 (12.06.95) FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): INSTITUT EUROPEEN DE BIOLOGIE CELLULAIRE [FR/FR]; 18, avenue de l'Europe, F-31520 Ramonville-Saint-Agne (FR). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): DUSSOURD D'HINTERLAND, Lucien [FR/FR]; 10, rue Pierre-Benoit, F-31400 Toulouse (FR). PINEL, Anne-Marie [FR/FR]; 771, rue des Navigateurs, La Grande-Motte, F-34280 La Grande-Motte (FR). (74) Mandataires: MARTIN, Jean-Jacques etc.; Cabinet Regimbeau, 26, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).	(81) Etats désignés: AU, CA, IL, JP, NZ, US, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale. Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont reçues.</i> (88) Date de publication du rapport de recherche internationale: 30 janvier 1997 (30.01.97)	
(54) Title: CONJUGATES OF α MSH WITH A FATTY ACID, PREPARATION METHOD THEREFOR, AND USE THEREOF AS A DRUG		
(54) Titre: CONJUGUES D' α MSH AVEC UN ACIDE GRAS, LEUR PROCÉDE DE PRÉPARATION ET LEUR UTILISATION A TITRE DE MÉDICAMENT		
(57) Abstract		
<p>A peptide conjugate comprising a peptide sequence that includes at least one sequence of four αMSH-derived amino acids optionally in a natural form, said sequence being chemically or physically conjugated with acids selected from either dicarboxylic acids of general formula (I): HOOC-R1-COOH, wherein R1 is a straight or branched alkylene radical having at least 3 and preferably 3-10 carbon atoms, and being optionally substituted, in particular by one or more amino or hydroxy groups; or α-monounsaturated fatty acids with a cis or preferably trans configuration, of general formula (II): R2-CH=CH-COOH, wherein R2 is a straight or branched alkyl radical having at least 6 and preferably 6-10 carbon atoms, and being substituted by an amino, hydroxy or oxo group.</p>		
(57) Abrégé		
<p>L'invention concerne un conjugué peptidique, caractérisé en ce qu'il comporte une séquence peptidique comprenant au moins une séquence de 4 acides aminés dérivés de l'αMSH, les acides aminés étant sous forme naturelle ou non, ladite séquence étant conjuguée, chimiquement ou physiquement avec des acides sélectionnés parmi: les acides di-carboxyliques de formule générale (I): HOOC-R1-COOH, dans laquelle R1 représente un radical alkylène, linéaire ou ramifié, comprenant au moins 3 atomes de carbone, de préférence de 3 à 10 atomes de carbone, éventuellement substitué, notamment par un ou plusieurs groupes amino ou hydroxy, et les acides gras α-monoinsaturés de configuration cis ou trans, de préférence trans, de formule générale (II): R2-CH=CH-COOH, dans laquelle R2 représente un radical alkyle, linéaire ou ramifié comprenant au moins 6 atomes de carbone, de préférence de 6 à 10 atomes de carbone, substitué par un groupe amino, hydroxy ou oxo.</p>		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Arménie	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
AT	Autriche	GE	Géorgie	MX	Mexique
AU	Australie	GN	Guinée	NE	Niger
BB	Barbade	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BE	Belgique	HU	Hongrie	NO	Norvège
BF	Burkina Faso	IE	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BG	Bulgarie	IT	Italie	PL	Pologne
BJ	Bénin	JP	Japon	PT	Portugal
BR	Brésil	KE	Kenya	RO	Roumanie
BY	Bélarus	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CA	Canada	KP	République populaire démocratique de Corée	SD	Soudan
CF	République centrafricaine	KR	République de Corée	SE	Suède
CG	Congo	KZ	Kazakhstan	SG	Singapour
CH	Suisse	LI	Liechtenstein	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LR	Libéria	SN	Sénégal
CN	Chine	LT	Lituanie	SZ	Swaziland
CS	Tchécoslovaquie	LU	Luxembourg	TD	Tchad
CZ	République tchèque	LV	Lettonie	TG	Togo
DE	Allemagne	MC	Monaco	TJ	Tadjikistan
DK	Danemark	MD	République de Moldova	TT	Trinité-et-Tobago
EE	Estonie	MG	Madagascar	UA	Ukraine
ES	Espagne	ML	Mali	UG	Ouganda
FI	Finlande	MN	Mongolie	US	Etats-Unis d'Amérique
FR	France	MR	Mauritanie	UZ	Ouzbékistan
GA	Gabon			VN	Viet Nam

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PC1/FR 96/00890

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 C07K14/685 A61K47/48

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 6 C07K A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	FR 2 691 465 A (PF MEDICAMENT) 26 November 1993 see page 3, line 13 - page 4, line 9; claims 1,5,8,9 ---	1-3,5, 8-12
X	EP 0 389 950 A (LION CORP) 3 October 1990 see page 2, line 48 - page 3, line 6; claims ---	1,2,8-12
X	BIOCHEMISTRY, vol. 32, no. 45, 16 November 1993, pages 12264-12272, XP000403772 ITO A S ET AL: "STRUCTURE-ACTIVITY CORRELATIONS OF MELANOTROPIC PETIDES IN MODEL LIPIDS BY TRYPTOPHAN FLUORESCENCE STUDIES" see page 12265, left-hand column, paragraph 4 ---	1
-/--		

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 November 1996

Date of mailing of the international search report

11.12.96

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Fuhr, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR 96/00890

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>WO 95 08564 A (INST EUROP DE BIOLOG CELLULAIR ;DUSSOURD D HINTERLAND LUCIEN (FR);) 30 March 1995 see page 1, line 12 - line 21; claims; examples see page 4</p> <p style="text-align: center;">---</p>	1-12
A	<p>EP 0 517 211 A (TEIKOKU SEIYAKU KK) 9 December 1992 see page 3, line 6 - line 10 see page 3, line 29 - line 36; claims 1,2,6</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	1-12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intern: International Application No

PCT/FR 96/00890

PC1/FR 90/00890

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
FR-A-2691465	26-11-93	NONE		

EP-A-0389950	03-10-90	JP-A-	3123716	27-05-91
		US-A-	5126327	30-06-92
		JP-A-	3123717	27-05-91

WO-A-9508564	30-03-95	FR-A-	2710340	31-03-95
		AU-A-	7785994	10-04-95
		CA-A-	2149925	30-03-95
		EP-A-	0669938	06-09-95
		JP-T-	8503963	30-04-96

EP-A-0517211	09-12-92	AU-B-	653026	15-09-94
		AU-A-	1726492	10-12-92
		CA-A-	2070061	08-12-92
		JP-A-	5148154	15-06-93

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PC1/FR 96/00890

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 6 C07K14/685 A61K47/48

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
CIB 6 C07K A61K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	FR 2 691 465 A (PF MEDICAMENT) 26 Novembre 1993 voir page 3, ligne 13 - page 4, ligne 9; revendications 1,5,8,9 ---	1-3,5, 8-12
X	EP 0 389 950 A (LION CORP) 3 Octobre 1990 voir page 2, ligne 48 - page 3, ligne 6; revendications ---	1,2,8-12
X	BIOCHEMISTRY, vol. 32, no. 45, 16 Novembre 1993, pages 12264-12272, XP000403772 ITO A S ET AL: "STRUCTURE-ACTIVITY CORRELATIONS OF MELANOTROPIC PETIDES IN MODEL LIPIDS BY TRYPTOPHAN FLUORESCENCE STUDIES" voir page 12265, colonne de gauche, alinéa 4 --- -/--	1

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

X document particulièrement pertinent l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

Y document particulièrement pertinent l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

Z document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

27 Novembre 1996

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

11.12.96

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tél. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Fuhr, C

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	WO 95 08564 A (INST EUROP DE BIOLOG CELLULAIRE ;DUSSOURD D HINTERLAND LUCIEN (FR);) 30 Mars 1995 voir page 1, ligne 12 - ligne 21; revendications; exemples voir page 4	1-12
A	EP 0 517 211 A (TEIKOKU SEIYAKU KK) 9 Décembre 1992 voir page 3, ligne 6 - ligne 10 voir page 3, ligne 29 - ligne 36; revendications 1,2,6	1-12

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale No

PC1/FR 96/00890

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR-A-2691465	26-11-93	AUCUN	
EP-A-0389950	03-10-90	JP-A- 3123716	27-05-91
		US-A- 5126327	30-06-92
		JP-A- 3123717	27-05-91
WO-A-9508564	30-03-95	FR-A- 2710340	31-03-95
		AU-A- 7785994	10-04-95
		CA-A- 2149925	30-03-95
		EP-A- 0669938	06-09-95
		JP-T- 8503963	30-04-96
EP-A-0517211	09-12-92	AU-B- 653026	15-09-94
		AU-A- 1726492	10-12-92
		CA-A- 2070061	08-12-92
		JP-A- 5148154	15-06-93